

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N 000299/02- 05 02 14
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Панавир®

наименование лекарственного препарата

раствор для внутривенного введения 0,04 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко, Россия

ООО Медицинский центр «Эллара», Россия

ООО «Эллара», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения Изменения « ___ » 05 02 14 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ <ul style="list-style-type: none">• Герпесвирусные инфекции различной локализации (в том числе рецидивирующий генитальный герпес, герпес Зостер и офтальмогерпес).• Вторичные иммунодефицитные состояния на фоне инфекционных заболеваний.• Цитомегаловирусная инфекция, в том числе у пациенток с привычным невынашиванием беременности.	ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ <ul style="list-style-type: none">• Герпесвирусные инфекции различной локализации (в том числе рецидивирующий генитальный герпес, герпес Зостер и офтальмогерпес).• Вторичные иммунодефицитные состояния на фоне инфекционных заболеваний.• Цитомегаловирусная инфекция, в том числе у пациенток с привычным невынашиванием беременности.

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> • Применяется у женщин с хронической вирусной инфекцией и интерферонодефицитным состоянием на этапе подготовки к беременности. • Папилломавирусная инфекция (аногенитальные бородавки) в составе комплексной терапии. • Язвенная - болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов с длительно рубцующимися язвами и симптоматическими язвами гастродуоденальной зоны в составе комплексной терапии. • Клещевой энцефалит с целью снижения вирусной нагрузки и снятия неврологической симптоматики (анизорефлексии, снижения рефлексов, болезненности точек выхода черепно-мозговых нервов, нистагма) в составе комплексной терапии. • Ревматоидный артрит, сочетанный с герпесвирусной инфекцией у иммунокомпрометированных больных (для усиления анальгетического и противовоспалительного эффекта основной терапии), в составе комплексной терапии. • ОРВИ и грипп в составе комплексной терапии. • Панавир® применяют в комплексной терапии хронического бактериального простатита. 	<ul style="list-style-type: none"> • Применяется у женщин с хронической вирусной инфекцией и интерферонодефицитным состоянием на этапе подготовки к беременности. • Хроническая цитомегаловирусная инфекция в стадии обострения у беременных во II и III триместре в составе комплексной терапии. • Папилломавирусная инфекция (аногенитальные бородавки) в составе комплексной терапии. • Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов с длительно рубцующимися язвами и симптоматическими язвами гастродуоденальной зоны в составе комплексной терапии. • Клещевой энцефалит с целью снижения вирусной нагрузки и снятия неврологической симптоматики (анизорефлексии, снижения рефлексов, болезненности точек выхода черепно-мозговых нервов, нистагма) в составе комплексной терапии. • Ревматоидный артрит, сочетанный с герпесвирусной инфекцией у иммунокомпрометированных больных (для усиления анальгетического и противовоспалительного эффекта основной терапии) в составе комплексной терапии. • ОРВИ и грипп в составе комплексной

Старая редакция	Новая редакция
<p>ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ</p> <p>Применение во время беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.</p> <p>При необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание на период приема препарата следует прекратить.</p> <p>СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Панавир® следует вводить внутривенно струйно медленно. • Терапевтическая доза препарата составляет 200 мкг действующего вещества (содержимое одной ампулы или флакона). • Для лечения герпесвирусных инфекций и клещевого энцефалита применяют двукратно с интервалом 48 или 24 ч. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 месяц. • Для лечения цитомегаловирусной и папилломавирусной инфекций применяют трехкратно в течение первой недели с интервалом 48 ч и двукратно в течение второй недели с интервалом 72 ч. 	<p>терапии.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Панавир® применяют в комплексной терапии хронического бактериального простатита. <p>ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ</p> <p>Применение возможно во II и III триместре по показанию хроническая цитомегаловирусная инфекция в стадии обострения в составе комплексной терапии. В остальных случаях применение возможно только, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.</p> <p>При необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание на период приема препарата следует прекратить.</p> <p>СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Панавир® следует вводить внутривенно струйно медленно. • Терапевтическая доза препарата составляет 200 мкг действующего вещества (содержимое одной ампулы или флакона). • Для лечения герпесвирусных инфекций и клещевого энцефалита применяют двукратно с интервалом 48 или 24 ч. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 месяц. • Для лечения цитомегаловирусной и папилломавирусной инфекций применяют трехкратно в течение первой недели с

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> • Для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения и симптоматических язв гастродуоденальной зоны применяют 5 внутривенных инъекций через день в течение 10 дней. • Для лечения ревматоидного артрита, сочетанного с герпесвирусной инфекцией у иммунокомпрометированных больных, применяют 5 внутривенных инъекций с интервалом 24-48 ч, в случае необходимости курс повторить через 2 месяца. • Для лечения ОРВИ и гриппа применяют 2 внутривенные инъекции с интервалом 18-24 ч. • Для лечения больных с хроническим бактериальным простатитом применяют 5 внутривенных инъекций с интервалом 48 ч. 	<ul style="list-style-type: none"> интервалом 48 ч и двукратно в течение второй недели с интервалом 72 ч. • Для лечения хронической цитомегаловирусной инфекции в стадии обострения у беременных во II и III триместре применяют трехкратно в течение первой недели с интервалом 48 ч и двукратно в течение второй недели с интервалом 72 ч. • Для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения и симптоматических язв гастродуоденальной зоны применяют 5 внутривенных инъекций через день в течение 10 дней. • Для лечения ревматоидного артрита, сочетанного с герпесвирусной инфекцией у иммунокомпрометированных больных, применяют 5 внутривенных инъекций с интервалом 24-48 ч, в случае необходимости курс повторить через 2 месяца. • Для лечения ОРВИ и гриппа применяют 2 внутривенные инъекции с интервалом 18-24 ч. • Для лечения больных с хроническим бактериальным простатитом применяют 5 внутривенных инъекций с интервалом 48 ч.

Генеральный директор
ООО «Национальная
Исследовательская Компания»



Арсенков В.В.